

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14
(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

n° XXXI - 12 Avril 1963

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DES FRUITS A PEPINS

CULTURES FRUITIERES

La maturité des périthèces de Tavelure est relativement en avance par rapport à l'évolution de la végétation. Les premières contaminations par ascospores sont maintenant possibles.

- 1) Poiriers ayant dépassé le stade C 3 et ayant reçu un premier traitement avant le 10 avril : renouveler l'opération du 15 au 17 Avril
- 2) Autres poiriers : assurer la protection au fur et à mesure que les variétés arrivent au stade C3
- 3) Pommiers ayant au moins atteint le stade C 3 : effectuer un 1er traitement du 15 au 17 Avril
- 4) Pommiers plus tardifs : assurer la protection au fur et à mesure que les variétés atteignent le stade C 3 - D

REMARQUE : L'emploi d'un produit cuprique permet de lutter également contre des maladies secondaires et le chancre.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER

La première opération consiste à éliminer mécaniquement les rameaux oïdiés et à les détruire. En outre, les traitements préfloraux à forte pression et utilisant de grosses quantités de liquide permettent de limiter dans une certaine mesure l'extension du champignon.

TRAITEMENTS MIXTES OIDIUM - TAVELURE : Ces traitements sont souvent d'application difficile car la forte pression et la forte quantité de liquide nécessaires pour lutter efficacement contre l'oïdium sont peu opportunes dans le cas de la Tavelure (ruissellement abondant).

- Dans nos vergers, l'emploi du soufre seul se révèle en général insuffisant pour lutter efficacement contre la Tavelure. Il est donc prudent d'y adjoindre un fongicide de synthèse.

PUCERON VERT DU POMMIER

Les pullulations de cet insecte sont déjà observées et il est trop tôt pour employer à bon escient un produit systémique. Si nécessaire, ajouter à la Bouillie un aphicide de contact polyvalent (type H.C.H., lindane, parathion...) qui permettra éventuellement de lutter contre d'autres ravageurs préfloraux. Cette opération est particulièrement utile sur les arbres n'ayant pas reçu de traitement aux huiles jaunes.

ANTHONOME DU POMMIER

Dans les vergers sensibles, en particulier ceux entourés de pommiers hautes-tiges non traités, la protection des arbres doit être assurée lorsque les bourgeons sont situés entre les stades B et D.

COLZA

CHARANCON DE LA TIGE

Ce ravageur est devenu assez rare dans nos régions et n'a pas encore été observé cette année. Il est prudent cependant de surveiller les cultures car les températures sont favorables actuellement à son activité et les plantes sont encore peu vigoureuses.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

R. DIVOUX

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

P. COUTURIER